
A csincsilla rendszertani helye, származása

 A csincsilla legközelebbi rokona a viszkacsa, vagy más néven pampaszi nyúl (Viscacia viscacia) és a macskanyulak, köztük a legismertebb a perui macskanyúl.






Közeli rokonai a tarajos sülök, a kapibarák, és a marák. Ezek a vízidisznók közé sorolható állatok külsőleg is emlékeztetnek a csincsillákra. A dél-amerikai rágcsálók közül még idesorolhatók az agutik, a pakák, a tengeri malac és a nutria.


A csincsillának 2 faja ismert:
- Chinchilla lanigera - ez az általunk tartott kiskedvenc, és
- Chinchilla brevicaudata, ezt nem szokás háziállatként tartani
(volt még pár egyéb Chinchilla faj is, de azok kipusztultak)

A brevicaudatának kisebb és szőrös (!) fülei vannak, az egész állat viszont nagyobb, mint a lanigera. A két fajt lehet keresztezni, mint pl. a lovat meg a szamarat - az eredmény is ugyanaz: tovább nem szaporítható egyedek.




A Chinchilla lanigerának két alfaja, inkább típusa ismert a tenyésztésben: a La Plata és a Costina. Előbbi Dél-Amerika belsejében élt, és "kerekebb" (pisze orrú csinik) az utóbbi a part mentén, és karcsúbb az állat (hegyes orrú).












Kép forrása, Szerző: Norka

(Fő)Fő(Felnőtt nőstény) Felnőtt bak











alsó zóna, fehér szalag, szürke fátyol.




















Photo
CHRIS CHINCHILLAS













Képek: Kytiara, Csincsilla gazdija: Norka













Z [illegible] ja és oldalak, fehér has, szürke fülek, sötét szem. Elmosódott



[illegible] Általában gyengéd, [illegible] A [illegible] fehér,













































Photo
CHRIS CHINCHILLAS



ezt az elnevezést a világos tan-ekre is.



foltjai








has,



S lábakon, violet oldalak, fehér has, szürke fülek, sötét szemek.



Z **soyn)** Ha foltos akkor violet foltjai vannak, a hasa mindig fehér.



Z **Ép** Sötét zafír hát, zafír oldalak, fehér has, csíkok a lábakon,



kek) b zafír színű csincsilla zafír színű hassal. Rózsaszín fülek,



al) Ha foltos, akkor zafír foltjai vannak, a hasa mindig fehér.





